

Integral I.P.S.

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES DE SANGRE

PROGRAMA DE HEMOFILIA

HAREMOS:

1. VIH, HC y Hepatitis b en los no inmunes (Ag Hbs y AcHbS).

2. Factor e inhibidor.

3. Perfil lipídico mínimo. Antígeno prostático especifico en los mayores de 50 años.

4. Portadoras de hemofilia A o B solo se les solicitara niveles de factor VIII o IX respectivamente.

5. Hematología los solicitara un mes previo a la realización.

5. Para la toma de las muestras preguntar en enfermería.

EN VON WILLEBRAND:
Debemos cumplir con los requerimientos de la CAC

1. VIH, HC y Hepatitis b en los no inmunes. (Ag Hbs y AcHbS)

2. Factor VIII, FVW, Actividad de von Willebrand, test de unión al colágeno, RIPA, unión de VW al FVIII, multímetros e inhibidor contra VW.

3. Perfil lipídico mínimo. Antígeno prostático especifico en los mayores de 50 años.

4. Hematología los solicitara un mes previo a la realización.

5. Para la toma de las muestras preguntar en

enfermería.

COMO LO HAREMOS:

1.Presentarse en ayunas.

2.Para todos los que reciben profilaxis suspender el factor: Hemofilia A, 3 días y hemofilia B cuatro días. (Excepto los que están en tratamiento para una hemorragia)

3. Los resultados se revisan en la siguiente consulta.

4.Favor solicite copia impresa, que es para usted, del reporte cuando venga a consulta de hematología.

5.Pacientes que vienen de sitios lejano favor notificarlos con anticipación para que lleguen bien preparados.

6.Pacientes con inhibidores en inmunotolerancia se preparan según lo ordenado por Hematología.

EN VON WILLEBRAND:

1. Presentarse en ayunas y si esta sangrando mejor.
2. Para todos los que reciben profilaxis suspender el factor: Von Willebrand, 3 días.
3. Los resultados se revisan en la siguiente consulta.
4. Favor solicite copia impresa, que es para usted, del reporte cuando venga a consulta de hematología.
5. Pacientes que vienen de lejos favor notificarlos con anticipación para que lleguen bien preparados.

EN VON WILLEBRAND: TENGA EN CUENTA

- Que estén “aliviados”, no tengan, procesos infecciosos o inflamatorios intercurrentes que aumentan los niveles de factor.
- El miedo, el dolor, el estrés, el ejercicio, los viajes prolongados, el trasnocho, el embarazo, los anticonceptivos aumentan los niveles de factor.
- En algunos de los pacientes con 40 años de edad o más presentan pseudonormalización del FVIII y FVW.
- Los pacientes con hipotiroidismo descompensado los disminuye.

Integral I.P.S.

PACIENTES EN INMUMNOTOLERANCIA

Programa de Hemofilia

COMO LO HAREMOS:

1. Presentarse en ayunas.
2. Pacientes que vienen de lejos favor notificarlos con anticipación para que lleguen bien preparados.
3. Se les realiza factor e inhibidor cada mes.
4. Una vez el inhibidor se negativice se inician las pruebas de recuperación así:

- Se aplica el factor en la dosis que viene recibiendo.
- Se toma 6 horas después muestra para factor e inhibidor.
- Estas se repetirán de forma sucesiva mensualmente durante varios meses.

Integral I.P.S.

F A R M A C O C I N E T I C A

Para pacientes en profilaxis.

Programa de Hemofilia

"Porque el futuro es hoy"

COMO LO HAREMOS:

1. Presentarse en ayunas.

2. No requiere suspensión de factor.

3. Pacientes que vienen de lejos favor notificarlos con anticipación para que lleguen bien preparados.

4. Aplicar la dosis profiláctica.

5. Tomar muestras de factor a los 30 minutos, 4 horas y 24 horas.

6. Una vez tomadas las tres muestras avisar a hematología y servicio farmacéutico.



DEBEMOS HABLAR EL MISMO IDIOMA PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS.

Así informamos a los pacientes

Integral I.P.S.