Cirugía oral mínimamente invasiva: Experiencia y resultados

Luz Helena María Jaramillo M. OD INTEGRAL IPS

Caso Clínico

Paciente femenina, 53 años, Enfermedad Von Willebrand factor > 1%. Secuelas graves por eventos hemorrágicos en su vida, tratamiento a demanda.

Anemización crónica, descartan causas ginecológicas y nutricionales, conclusión:origen bucal

Diagnóstico: Enfermedad periodontal severa, gingivorragia permanente de intensidad variable, dificultad para comer, hablar y sonreír.



Propuesta de tratamiento

Exodoncias de dientes consecutivos, 7 en el maxilar superior y 6 en el inferior un solo tiempo quirúrgico ambulatorio.

Anteriormente se realizaron dos exodoncias con A. Tranexámico oral, 1 Gram/VO/6 horas/ 7 días,F. VIII +f. Von Willebrand 2000 UI/iv una hora antes del procedimiento, otra 6 horas después, sin complicaciones, para ganar la confianza de la paciente y su familia.

Procedimiento:

Una hora antes: 500 mg de acetaminofén, 10 mg de buspirona, 1 gramo de A. Tranexámico vía oral y 2000 UI/IV Factor VIII+F. Von Willebrand.

Desinfección: Digluconato de Clorhexidina 0.2% enjuague 4 minutos.

Anestesia infiltrativa Lidocaina 2% + epinefrina, caninos superiores y Ag. Dentario anterior.

Exodonciasmínimamente traumática:
14,13,23,24,25,26,27,33,32,31,41,42,43.Hemostasia local: A. Tranexámico +lidocaína al 2%, en macilla, tapón de gelfoam®, sutura simple en cada alveolo, seda 3/0. Sin sellar por completo el alveolo.

Alveolo del 13 sangra en capa, aplicamos 2000 UI/IV de F. VIII+ F. Von Willebrand. Buena evolución inmediata.

Seis horas después de la última dosis, 2000 UI de Factor. Recomendaciones generales para el cuidado posoperatorio, A. Tranexámico 1 Gr / 6 horas/VO/ 7 días, Acetaminofén 500 mg/VO/4horas/3 días.

Sin complicaciones, retiro sutura a las 2 semanas con hemostasia local. Rehabilitación con prótesis total y en perfecto estado de salud. Anemia resuelta con alimentación normal.

Conclusión: Las recomendaciones de FMH para este procedimiento resultaron adecuadas, el manejo de la ansiedad y analgesia del paciente es necesario y efectivo.